

CHAGAS: UM ASSASSINO SILENCIOSO



A doença de Chagas é uma **doença tropical negligenciada** e que é causada pelo parasita *Trypanosoma cruzi*.

Esta doença é propagada principalmente por insetos **triatomíneos**.

Se não for tratada, a doença de Chagas pode provocar **problemas graves no coração e no sistema digestivo**.

Os triatomíneos (conhecidos como vinchuca, barbeiro, pito, chinche ou chipo) transportam o parasita



1

Este inseto esconde-se nas paredes e debaixo dos telhados das cabanas de adobe



2

Mordem as pessoas durante o sono e defecam perto da mordida, fazendo-as contrair a doença



3

O vírus também pode ser transmitido por:

- Alimentos contaminados
- Transfusões de sangue e transplantes de órgãos
- Transmissão de mãe para filho



4

Fase aguda (2 meses)

É a única altura em que a doença de Chagas pode ser diagnosticada

Sintomas ligeiros ou ausência de sintomas



Fase crónica assintomática (10-30 anos)

Sem sintomas



Fase clínica crónica

1 em cada 3 pessoas infetadas contraem problemas cardíacos e do sistema digestivo que podem provocar a **morte**

6-7 MILHÕES

pessoas afetadas



12 000

pessoas morrem todos os anos desta doença



Apenas

1 EM CADA 10



é diagnosticada

75 MILHÕES

as pessoas que vivem na América Latina correm o risco de contrair a doença de Chagas

Outrora confinada exclusivamente à América Latina, a doença de Chagas tem vindo a alastrar-se a outros continentes em resultado das migrações

CONTROLO E PREVENÇÃO

Pulverizar as casas e as imediações com inseticidas para eliminar os insetos



Fazer análises ao sangue e aos dadores de órgãos



Triagem de crianças de mães infetadas



TRATAMENTO



Recomendado para:

- Todas as crianças com infeção congénita
- Todos os doentes durante a fase crónica inicial
- Adultos, em especial durante a fase assintomática crónica da doença

Durante a fase crónica tardia, são normalmente indicados de forma adicional tratamento médico durante toda a vida e cirurgia.